

《ソリリス®/ユルトミス®を使用中の患者様にお伝えいただきたいこと》

ソリリス®/ユルトミス®を
処方いただいている先生方へ

アレクシオンファーマ合同会社

髄膜炎菌感染症リスク対策に関するお願い

—新型コロナウイルス感染症対応との相違—

髄膜炎菌感染症と新型コロナウイルス感染症の初期症状が共に発熱であることから、髄膜炎菌感染症であった場合の対応が遅れるリスクを考慮し、改めて注意喚起をさせていただきます。

ソリリス®/ユルトミス®を使用中の患者様につきましては、発熱等の感染症状を認めた場合、従前どおり、直ちに主治医に連絡するよう周知いただきますようお願いいたします。

発熱等の感染症状を認めた場合、

1. 直ちに担当医師に連絡し、指示を仰ぐこと
2. 担当医師と連絡が取れない場合、直ちに救急車を呼び、「患者安全性カード」を救急隊員及び搬送先医師に提示すること

ソリリス®/ユルトミス®は、その作用機序から髄膜炎菌等のナイセリア属細菌に対する感染リスクが増大することが知られており、特に侵襲性髄膜炎菌感染症は、発症後 24 時間以内に死亡に至る可能性のある感染症であることから、早期に適切な抗菌薬による治療が必要です。

以上がソリリス®/ユルトミス®を使用中の患者様に周知いただきたい髄膜炎菌感染症のリスクに対する重要なお願いです。